

病害虫・雑草防除体系例

化学合成農薬（殺虫殺菌剤及び除草剤）の成分使用回数は12以内



令和2年4月24日
JA アルプス「富富」ブランド化推進協議会

<一般タイプ>

【粉剤体系】

区分	薬剤名	使用時期	使用量等	対象病害虫・雑草	成分数	
病害虫防除	種子消毒	モミガードC水和剤	浸種前	200倍液 (種子10kgに対し水20ℓ、薬剤100g)	ばか苗病、もみ枯細菌病、褐条病、 苗立枯細菌病、苗立枯病(トリコデルマ菌、 リゾープス菌、フザリウム菌)等	2
	苗箱施薬	ルーチンアドスピノ 箱粒剤	播種時～ 移植当日	50g/箱	いもち病、イネミズゾウムシ、 イネドロオイムシ、ニカメイチュウ、 フタオビコヤガ、ツマグロヨコバイ	2
		又は Dr.オリゼ フェルテラ粒剤	緑化期～ 移植当日			
	本田防除	ラブサイドキラップ 粉剤DL	穂揃期	4kg/10a	いもち病、カメムシ類、ウンカ類	2
スタークル粉剤DL		傾穂期	3kg/10a	カメムシ類、ウンカ類、 ツマグロヨコバイ	1	
雑草防除	初期剤	マーシエット 1キロ粒剤	移植後3～5 日まで	1kg/10a	水田1年生雑草、マツパイ、 ホタルイ、ミズガヤツリ	1
	一発 処理剤	NEW エンペラー1キロ粒剤 (エンペラージャンボ)	初期剤散布 7～10日後	1kg/10a (500g/10a)	水田1年生雑草、マツパイ、ホタルイ、 ミズガヤツリ、ウリカワ等	3
合計 11成分						

【液剤体系】

区分	薬剤名	使用時期	使用量等	対象病害虫・雑草	成分数	
病害虫防除	種子消毒	モミガードC水和剤	浸種前	200倍液 (種子10kgに対し水20ℓ、薬剤100g)	ばか苗病、もみ枯細菌病、褐条病、 苗立枯細菌病、苗立枯病(トリコデルマ菌、 リゾープス菌、フザリウム菌)等	2
	苗箱施薬	ルーチンアドスピノ 箱粒剤	播種時～ 移植当日	50g/箱	いもち病、イネミズゾウムシ、 イネドロオイムシ、ニカメイチュウ、 フタオビコヤガ、ツマグロヨコバイ	2
		又は Dr.オリゼ フェルテラ粒剤	緑化期～ 移植当日			
	本田防除	ラブサイドフロアブル キラップフロアブル	穂揃期	1,000倍液 150ℓ/10a	いもち病、カメムシ類、ウンカ類	2
スタークル液剤10		傾穂期	1,000倍液 150ℓ/10a	カメムシ類、ウンカ類、 ツマグロヨコバイ	1	
雑草防除	初期剤	マーシエット 1キロ粒剤	移植後3～5 日まで	1kg/10a	水田1年生雑草、マツパイ、 ホタルイ、ミズガヤツリ	1
	一発 処理剤	NEW エンペラー1キロ粒剤 (エンペラージャンボ)	初期剤散布 7～10日後	1kg/10a (500g/10a)	水田1年生雑草、マツパイ、ホタルイ、 ミズガヤツリ、ウリカワ等	3
合計 11成分						

<省成分タイプ>

【粉剤体系】

区分	薬剤名	使用時期	使用量等	対象病害虫・雑草	成分数	
病害虫防除	種子消毒	テクリードC フロアブル	浸種前	200倍液 (種子10kgに対し水20ℓ、薬剤100cc)	もみ枯細菌病、苗立枯細菌病、褐条病、 ばか苗病、いもち病、ごま葉枯病、苗立枯病 (リゾープス菌、トリコデルマ菌)	1
	苗箱施薬	フェルテラ箱粒剤	播種時～ 移植当日	50g/箱	ニカメイチュウ、コブノメイガ、フタオビコヤガ、 イネツトムシ、イネドロオイムシ、 イネミズゾウムシ	1
	本田防除	ラブサイドキラップ 粉剤DL	穂揃期	4kg/10a	いもち病、カメムシ類、ウンカ類	2
		スタークル粉剤DL	傾穂期	3kg/10a	カメムシ類、ウンカ類、 ツマグロヨコバイ	1
雑草防除	初期剤	マーシエット 1キロ粒剤	移植後3～5 日まで	1kg/10a	水田1年生雑草、マツパイ、 ホタルイ、ミズガヤツリ	1
	一発 処理剤	エンペラー1キロ粒剤 (エンペラージャンボ)	初期剤散布 7～10日後	1kg/10a (500g/10a)	水田1年生雑草、マツパイ、ホタルイ、 ミズガヤツリ、ウリカワ等	3
合計 9成分						

【液剤体系】

区分	薬剤名	使用時期	使用量等	対象病害虫・雑草	成分数	
病害虫防除	種子消毒	テクリードC フロアブル	浸種前	200倍液 (種子10kgに対し水20ℓ、薬剤100cc)	もみ枯細菌病、苗立枯細菌病、褐条病、 ばか苗病、いもち病、ごま葉枯病、苗立枯病 (リゾープス菌、トリコデルマ菌)	1
	苗箱施薬	フェルテラ箱粒剤	播種時～ 移植当日	50g/箱	ニカメイチュウ、コブノメイガ、フタオビコヤガ、 イネツトムシ、イネドロオイムシ、 イネミズゾウムシ	1
	本田防除	ラブサイドフロアブル キラップフロアブル	穂揃期	1,000倍液 150ℓ/10a	いもち病、カメムシ類、ウンカ類	2
		スタークル液剤10	傾穂期	1,000倍液 150ℓ/10a	カメムシ類、ウンカ類、 ツマグロヨコバイ	1
雑草防除	初期剤	マーシエット 1キロ粒剤	移植後3～5 日まで	1kg/10a	水田1年生雑草、マツパイ、 ホタルイ、ミズガヤツリ	1
	一発 処理剤	NEW エンペラー1キロ粒剤 (エンペラージャンボ)	初期剤散布 7～10日後	1kg/10a (500g/10a)	水田1年生雑草、マツパイ、ホタルイ、 ミズガヤツリ、ウリカワ等	3
合計 9成分						

※残草が見られた場合は、草種に応じて後期除草剤を散布する。

ノビエの場合：クリンチャー1キロ粒剤またはクリンチャーEW(1成分)、広葉雑草(ホタルイ等)の場合：バサグラン粒剤またはバサグラン液剤(1成分)、ノビエ・広葉両方の場合：クリンチャーバスME液剤(2成分)