

# 湛水直播管理情報（第5号）

～ カルパー直播、鉄コーティング直播 ～

令和2年8月28日

アルプス農協管内農業技術者協議会

## 現在の生育状況（コシヒカリ）

カルパー直播は、出穂期が平年より2日遅くなり、穂揃期の生育は、草丈が長く、穂数は平年より少なく、葉色は濃くなりました。

鉄コ直播は、出穂期が近年より4日遅くなり、穂揃期の生育は、草丈が長く、穂数は近年より多く、葉色は近年並みとなりました。

出穂以降の気温は平年よりも高く推移していますので、刈取りまでの適切な水管理や適期収穫、丁寧な乾燥・調製作業をしっかりと行い、品質・食味の良い「アルプス米」に仕上げましょう。

＜JAアルプス管内 直播栽培の状況＞ ※生育調査圃数：カルパー直播2地点、鉄コーティング直播2地点の平均

播種様式	年次	草丈(cm)	穂数(本/㎡)	葉色	出穂期
カルパー直播	R2	114	338	4.4	8/7
	R元	104	336	4.3	8/6
	平年(H22～R元)	108	364	4.0	8/5
鉄コ直播	R2	117	437	4.4	8/11
	R元	104	347	4.2	8/7
	近年(H22～R元)	109	387	4.4	8/7

※1 平年：H22～R元の平均、 ※2 近年：H26～R元の平均

## 当面の管理ポイント

### 1 刈取りまでの水管理

○刈取りの5～7日前までは間断かん水を行い、稲体の活力を維持しましょう。

○フェーンなど高温が予想される場合は事前に入水し、急激な枯れ上りを防ぎましょう。

### 2 雑草の抜取り

○刈取りの前までにクサネム等の雑草を抜き、異物混入を防ぎましょう。



クサネムが繁茂した圃場



玄米に混入したクサネムの種子



### 3 適期刈取

○播種日や圃場の場所等によって、成熟期に差がみられます。必ず圃場ごとに籾の黄化率を確認して、適期に刈取りましょう。

【出穂期別の刈取適期の目安】

出穂期	刈取適期
8月7日頃	9月12日～9月14日頃
8月11日頃	9月17日～9月19日頃



### 4 乾燥・調製

○籾水分をこまめにチェックし、玄米水分は14.5～15.0%に仕上げましょう。

○乾燥調製の詳細は、営農情報第10号の裏面、下記のYouTubeをご覧ください。



【YouTube】  
17 乾燥作業



【YouTube】  
18 調整作業