

西洋なし栽培情報 第1号

令和6年4月4日
アルプス農業協同組合
富山県富山農林振興センター

1 生育概況

西洋なし「ラ・フランス」の開花は、下表のとおり予想されています(3/30 現在)。

開花予想は今後の気温に大きく左右されます。現時点の予想より早くなることも想定し、こまめに園地を観察し、人工受粉、防除等の作業を進めてください。

表 開花予想 (3/30 現在)

	令和6年予想		令和5年		令和4年		令和3年	
	開花始	開花盛	開花始	開花盛	開花始	開花盛	開花始	開花盛
ラ・フランス	4/15	4/20	4/6	4/9	4/12	4/16	4/5	4/7

2 人工受粉

・貯蔵花粉の慣らしは、以下の方法で行ってください。これを行わないと、発芽率が低くなる可能性があります。

- ①使用する2日前に冷凍庫から取り出す(温度に慣らす)。
- ②使用する1日前に乾燥剤を取り除く(湿度に慣らす)。

- ・受粉は、めしべの柱頭が湿っている午前中に終わるようにしてください。
- ・中短果枝(長さ5~10cm)を中心に受粉してください。花そうの元から2~5番目の花に受粉し、摘果する位置の花には行わないようにしましょう。
- ・花芽の着生が多い樹は少なめに、少ない樹にはしっかり受粉しましょう。摘果の省力化、樹勢コントロールにつながります。

3 病虫害防除

時期	対象病虫害	使用農薬	希釈倍率	100ℓあたり 必要薬剂量 ※
4月上中旬 (開花直前)	黒星病、赤星病、心腐れ症(胴枯病菌) (展着剤)	デランフロアブル	1,000倍	100 ml
		マイリノー	20,000倍	5 ml
4月中下旬 (落花後)	黒星病、うどんこ病、赤星病 心腐れ症(胴枯病菌) (展着剤)	アンビルフロアブル	2,000倍	50 ml
		トップジンM水和剤	1,500倍	66 g
		マイリノー	20,000倍	5 ml

※:散布量 1回目は300ℓ/10a、2回目以降は500ℓ/10a

農薬散布にあたっては、周辺の他の作物や住宅等への飛散防止に努めてください。

脚立での作業や、農業機械での作業時等の作業安全対策を徹底し、農作業事故発生防止に十分努めてください。