

さといも管理情報 No. 1

令和6年6月25日
アルプス農業協同組合
富山県富山農林振興センター

J Aアルプス管内のさといも生育は、おおむね順調に推移していますが、6月中旬頃よりスズメガ類が発生しています。今後の害虫の被害を抑えるため、以下の対策をお願いします。

1. 害虫対策

ほ場を見回り、害虫の発生がみられた場合は、下表の薬剤をローテーション散布してください。(展着剤加用)

なお、薬剤散布に当たっては、薬害防止のため、朝又は夕方涼しい時間帯に行ってください。

| 薬剤名 | 対象害虫 | 希釈倍数 | 使用時期 | 使用回数 | RACコード※ |
|--------------|--------------------|------------------|---------|------|---------|
| アディオン乳剤 | アブラムシ類 スズメガ類 | 2,000～ 3,000倍 | 収穫7日前まで | 5回 | 3A |
| エルサン乳剤 | ハスモンヨトウ | 1,000倍 | 収穫7日前まで | 1回 | 1B |
| | アブラムシ類 | 1,000～ 2,000倍 | | | |
| コテツ フロアブル | カンザワハダニ ハスモンヨトウ | 2,000倍 | 収穫7日前まで | 2回 | 13 |

※農薬の作用機構分類の分類コード



写真：セスジスズメ

【問い合わせ先】

アルプス農業協同組合営農部 営農企画課 TEL:076-472-5480
富山県富山農林振興センター 園芸振興班 担当:金森 TEL:076-444-4523