

白ねぎ管理情報 No. 1

令和7年3月13日
J A アルプス
富山県富山農林振興センター

北陸地方の向こう1か月の平均気温は「高い」と予報が出ています。適宜、換気・かん水管理を行い、健苗育成に努めてください。

1 かん水管理

- ・育苗箱の乾きの程度を確認し、乾き始めてきたら、午前中にかん水する。
- ・過剰なかん水を行うと、加湿により発芽及び生育不良、病害の発生が助長されるため、育苗箱が湿っている場合はかん水しない。

2 温度管理

時間帯	管理内容
日中	・ <u>ハウス内温度が30℃以上にならないように管理する。</u> ・晴天日にハウスを閉め切ると、ハウス内温度が30℃を超えるため、ハウスサイドを開けて換気する。
夜間	・ハウスサイドを閉める。 ・霜・低温注意報が発表された場合は、ハウスサイドを閉めるとともに、ラブシート、パオパオ等の不織布を育苗箱の上に展張する。

3 苗の追肥

- ・育苗後半（は種45日経過）に、天候等では場の乾きが悪く、定植が遅れると予想される場合は、苗の活力を維持するため、5日おきに液肥（「野菜の達人」500倍液 [水1Lに対して肥料2gを溶かす]）をかん水代わりに施用する。

4 定植に向けた苗の順化

- ・苗を外気に慣れさせるため、定植前に順化处理を行う。
 - ② 順化の時期：定植の7～10日前
 - ② 順化時の苗の大きさ：本葉2枚目の葉長が本葉1枚目の半分以上（下図参照）

③ 順化の方法

	時間帯	管理内容
霜、低温注意報が発表されていない時	昼	ハウスサイドを全開にする。
	夜	
霜、低温注意報が発表された時	昼	ハウスサイドを閉める。
	夜	




図 順化处理を行う時期のねぎ苗

【問い合わせ先】

JAアルプス営農部 営農企画課

TEL:076-472-5480

富山県富山農林振興センター 園芸振興班 担当:金森

TEL:076-444-4523