

# 西洋なし栽培情報 第1号

令和7年3月25日  
アルプス農業協同組合  
富山県富山農林振興センター

## 1 生育概況

西洋なし「ラ・フランス」の開花は、下表のとおり予想されています(3/24 現在)。

開花予想は今後の気温に大きく左右されます。現時点の予想より早くなることも想定し、こまめに園地を観察し、人工授粉、防除等の作業を進めてください。

表 開花予想 (3/24 現在)

品種	令和7年予想		令和6年		令和5年		過去10カ年平均	
	開花始	開花盛	開花始	開花盛	開花始	開花盛	開花始	開花盛
ラ・フランス	4/17	4/20	4/13	4/15	4/6	4/9	4/11	4/15

## 2 人工授粉

・貯蔵花粉の慣らしは、以下の方法で行ってください。これを行わないと、授粉効果が十分に得られない可能性があります。

①使用する2日前に冷凍庫から取り出す(温度に慣らす)。

②使用する1日前に乾燥剤を取り除く(湿度に慣らす)。

・授粉作業は、日中の温かい時間帯に行ってください。なお、作業後3時間以内に降雨があった場合は、早めに授粉をやり直してください。

・中短果枝(長さ5~10cm)を中心に、また、1花そうの中で下から2~5番目の花に授粉してください。

・開花数が多い樹は、授粉する花数は少なめに、開花数が少ない樹には、授粉する花数を多くすることにより、摘果の省力化や樹勢コントロールにつながります。

## 3 病虫害防除

開花期前後の防除は、黒星病の重要防除時期です。散布ムラのないよう下表を参考に防除を実施してください。なお、降雨により病害の感染が広がるので、雨前散布を基本としてください。

成木基準

※:散布量 2回目:300L/10a、3回目以降:500L/10a

回	時期	主な対象病虫害	散布薬剤名	希釈倍数	100L 当たり 必要薬剤量 ※
2	4月中旬 (開花直前)	黒星病、赤星病、 心腐れ症(胴枯病菌) (展着剤)	デランフロアブル マイリノー	1,000倍 20,000倍	100 mL 5 mL
3	4月下旬 (落花後)	黒星病、うどんこ病、赤星病 心腐れ症(胴枯病菌) (展着剤)	アンビルフロアブル トップジンM水和剤 マイリノー	2,000倍 1,500倍 20,000倍	50 mL 66 g 5 mL

●農薬散布にあたっては、周辺の他の作物や住宅等への飛散防止に努めてください。

●脚立での作業や、農業機械での作業時等の作業安全対策を徹底し、農作業事故発生防止に十分努めてください。