

白ねぎ管理情報 No. 4

令和 7 年 5 月 21 日
アルプス農業協同組合
富山県富山農林振興センター

現在、白ねぎの生育は概ね順調です。梅雨入り前に疫病・べと病対策を行いましょう。また、うね間に雑草の発生が見られます。雑草対策を兼ねて土寄せをお願いします。

1 病害（疫病、べと病）対策

土寄せ前に「アリエッティ水和剤」を散布する。（展着剤添加）

薬剤名	10a 当たり使用量	使用方法	使用時期	FRAC コード
アリエッティ水和剤	800 倍	散布	収穫 3 日前まで	P7

2 土寄せ・定期防除

雑草対策及び葉鞘の肥大を促すため、土寄せを行う。葉の分岐点に土がかからない程度とする。

土寄せ前に「スタークル粒剤」、「オリゼメート粒剤」を株元散布する。

薬剤名	10a 当たり使用量	使用方法	使用時期	RAC コード
スタークル粒剤	6 kg	株元散布	収穫 3 日前まで	4A (IRAC)
オリゼメート粒剤	6 kg	株元散布	収穫 30 日前まで	P2 (FRAC)

3 雑草対策

土寄せ直後に「トレファノサイド乳剤」をほ場全面に散布する。

薬剤名	10a 当たり使用量	使用方法	使用時期
トレファノサイド乳剤	200～300mL (水 100L)	全面土壌散布	定植後雑草発生前、ただし 収穫 30 日前まで

4 害虫（ハモグリバエ類、アザミウマ類）対策

ハモグリバエ等虫害が目立つ場合は、「リーフガード顆粒水和剤」を散布する。（展着剤添加）

薬剤名	10a 当たり使用量	使用方法	使用時期	IRAC コード
リーフガード 顆粒水和剤	1,500 倍	散布	収穫 7 日前まで	14

（裏面に続く）

○管理作業に当たっての留意点

【農薬の登録確認・飛散防止について】

農薬の散布に当たっては、濃度や対象病虫害等、農薬容器のラベルを必ず確認してください。また、周辺の他の作物や住宅に薬剤が飛散しないよう十分に注意してください。

【農作業の安全について】

農業機械での作業時等の作業安全対策を徹底し、農作業事故発生防止に十分努めてください。

【熱中症対策について】

農作業に当たっては、こまめに水分を補給する等、熱中症対策に留意してください。

【問い合わせ先】

アルプス農業協同組合営農部 営農企画課

TEL:076-472-5480

富山県富山農林振興センター 園芸振興班 担当:金森

TEL:076-444-4523