



「富富富」通信(第2号)

令和7年7月11日
JAアルプス「富富富」ブランド化推進協議会

表1 富富富の生育状況（7月7日調査）

年度	田植日	草丈 (cm)	茎数 (本/m ²)	葉色	葉齢	幼穂 形成期	出穂期
R7年※1	5/14	65.6	479	4.1	11.4	(7/13) 予測	(8/5) 予測
R6年※2	5/15	64.6	530	4.3	12.1	7/10	8/1
近年※3	5/13	61.3	549	4.2	11.6	7/12	8/3

※1 管内5か所の平均 ※2 管内4か所の平均 ※3 H29～R6の平均

【管内調査圃場の生育状況】

近年に比べて草丈はやや長く、茎数は少なく、葉色は平年並、葉令の展開はやや遅くなっています。

管内平均の5月14日移植の圃場での幼穂形成期は近年より1日遅い、7月13日頃の予測です。

【生育量の目安】

目標とする生育量は表2のとおりです。
生育状況に応じた適切な水管理をしましょう。

収量が安定し、良食味・高品質
米に仕上がります！



表2 生育ステージ別目標生育量

	幼穂形成期	穂揃期
草丈	62 cm	90 cm
茎数 (70株/坪の場合)	580 本/m ² (27 本/株)	400 本/m ² (19 本/株)
群落葉色	4.0	4.4

1 幼穂形成期以降の水管理

- ・稲体や根の健全化のため、幼穂形成期から出穂期までは飽水管理を行いましょう。ただし、葉色が濃い場合は間断かん水を行いましょう。
- ・稲体の活力を維持し、胴割米の発生を防ぐため、出穂期から20日間は湛水管理とし、刈取り5～7日前までは間断かん水を徹底しましょう。
- ・下流域まで十分に水が行き渡るようかけ流しをやめ、地域での計画的な用水の利用に努めましょう。

【YouTube】
10 中干し後の
水管理



【YouTube】
15 水稻の登熟
期間の水管理



【生育中の水管理のイメージ】

生育期	幼穂形成期	出穂期	出穂20日後	収穫5～7日前
水管理	飽水管理	湛水管理	間断かん水	
水量				

飽水管理
とは

『飽水管理』 入水後→自然落水→入水（出穂始めまで繰り返す）



「田面の高い部分が隠れる程度」



繰り返す



「この状態になったら入水」



「この状態は乾かしすぎ」



足跡の水を
切らさないように

2 穂肥施用

① 基肥一発肥料

- ・原則、追加穂肥は施用しないでください。
- ・追加穂肥の施用は葉色診断を行い、慎重に判断してください。

幼穂形成期の14日後の葉色が4.2程度と薄い場合、出穂3日前（走り穂が確認される頃）までに、窒素成分で1.0kg/10a程度を施用。

② 分施肥系


- ・表3を参考に、必ず幼穂長（右図参照）を確認してから施用してください。
1回目穂肥時期である幼穂形成期の7日後頃の幼穂長は15mm程度です。

表3 土壌区分別穂肥施用量の目安

土壌区分	肥料名	施用量 (kg/10a)	
		1回目 (幼穂形成期の7日後)	2回目 (1回目の7日後)
砂壤土	追肥3号	5～7	10～13
壤土・黒ボク土			10～12
粘質土			10

玄米タンパク含有率の目標は
6.4%以下です。
過剰な施肥で高くなるので
注意しましょう。

幼穂形成期に目標生育量を超えている場合、
1回目穂肥は施用せず、幼穂形成期の14日後に追肥3号で10kg/10a施用してください。



3 病害虫防除（化学合成農薬の成分使用回数は 12 以内を厳守）

○今年はカメムシ類の密度がかなり高くなっています。2 回の基本防除を確実に実施しましょう。

○「葉いもち」の防除は省略できますが、「穂いもち」の防除は必須です。

・「令和 7 年産 富富富病害虫・雑草防除について（富富富通信第 1 号別紙）」記載の防除体系（①一般タイプ、②省成分タイプ）のいずれにおいても、表 4 のとおり基本防除を実施して下さい。

表 4 防除体系

	穂 揃 期	傾 穂 期
粉 剤	ラブサイドキラップ粉剤 DL （収穫 14 日前まで）	スタークル粉剤 DL （収穫 7 日前まで）
	散布量：4kg/10a	散布量：3kg/10a
液剤体系 《通常散布》	ラブサイド K2 フロアブル 1,000 倍 （収穫 14 日前まで）	スタークル液剤 10 1,000 倍 （収穫 7 日前まで）
	散布量：150L/10a	散布量：150L/10a
液剤体系 《空中散布》	ラブサイド K2 フロアブル 8 倍 （収穫 14 日前まで）	スタークル液剤 10 8 倍 （収穫 7 日前まで）
	散布量：0.8L/10a	散布量：0.8L/10a
対象 病害虫	いもち病、カメムシ類、 ウンカ類（※粉剤のみ）	カメムシ類、ウンカ類、 ツマグロヨコバイ
成分数	2	1

※散布の際は、農薬のラベルに記載された使用基準を必ず守りましょう。

【YouTube】
14 本田基本防除



アカヒゲ
ホソミドリ
カスミカメ

アカスジ
カスミカメ



斑点米

適期のカメムシ防除で
斑点米の発生を防ぎましょう！

流通基準を要確認！

- ・検査等級：1 等
- ・化学合成農薬の成分使用回数：12 以内
防除の前に今一度使用状況を確認しましょう。


4 熱中症対策

！ 熱中症対策をして作業を行いましょう！

〈熱中症予防のための 5 つのポイント〉


- ①気温の高い時間帯を外して作業しましょう
- ②こまめに休憩、水分・塩分補給をしましょう
- ③熱中症予防グッズを活用しましょう
- ④単独行動は避け、連絡を取り合いましょう
- ⑤熱中症警戒アラートを活用しましょう（環境省・気象庁 HP、富山防災 WEB で確認できます）

環境省ホームページ「熱中症予防情報サイト」
<https://www.wbgt.env.go.jp/>



熱中症が疑われる場合は、すぐに作業を中断して応急処置を行うか、病院で手当を受けましょう。

○熱中症による代表的な症状



○応急処置の例

- ・涼しい場所へ避難しましょう。
- ・服をゆるめて風通しをよくしましょう。
- ・水をかけたり、扇いだりして体を冷やしましょう。
（脇の下、両側の首筋、足の付け根を冷やすと効果的。）
- ・水分や塩分を補給しましょう。

「みんなが一丸となって
本県を代表するブランド米
に育てよう!!



「富富富」通信第 3 号（収穫乾燥調製等）は、8 月 25 日頃の発行予定です。